



Hieronder vindt u de behandelopties voor:

Patiënten met BMI ≥ 30 en < 35 kg/m² met vergrote buikomvang en/of comorbiditeit

Behandeloptie 1:

Adviseer uw patiënt de gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)



Is het gewichtsverlies na 1 jaar minder dan 5%, overweeg het toevoegen van gewichtsreducerende medicatie

Maak keuze medicatie op basis van:

- Effectiviteit
- Prijs
- Comorbiditeit

En houd rekening met de contra-indicaties en potentiële bijwerkingen





Behandeloptie 2:

Medicatie voor de behandeling van overgewicht en obesitas

Mysimba (naltrexon/bupropion) 	Saxenda (liraglutide 3,0 mg) 
Effectiviteit ^{1*} ++	Effectiviteit ^{1*} ++
Prijs per dag ¹ Rond de € 3,50	Prijs per dag ¹ Rond de € 7,00
Geregistreerde indicatie Als aanvulling op caloriearm dieet en verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing BMI ≥ 27 kg/m ² tot < 30 kg/m ² in aanwezigheid van één of meer gewichtsgelateerde comorbiditeiten (bv. diabetes type 2, dislipidemie of gereguleerde hypertensie) BMI ≥ 30 kg/m ²	Geregistreerde indicatie Als aanvulling op caloriearm dieet en verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing BMI ≥ 27 kg/m ² tot < 30 kg/m ² icm ten minste één gewichtsgelateerde comorbiditeit, zoals prediabetes of diabetes mellitus type 2, hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu BMI ≥ 30 kg/m ²
Vergoeding ² Vanaf BMI ≥ 27 tot < 30 kg/m ² met comorbiditeit, risicofactoren voor: hart- en vaatziekten, DM2, slaapapneu en/of artrose BMI ≥ 30 kg/m ²	Vergoeding ² Geen DM2 Niet in aanmerking voor operatie Vanaf BMI ≥ 35 in combinatie met een comorbiditeit (een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose) BMI ≥ 40 kg/m ²

Alli, Xenical (orlistat) 	Wegovy (semaglutide 2,4 mg) 
Effectiviteit ^{1*} +	Effectiviteit ^{1*} +++
Prijs per dag ¹ Rond de € 2,00	Prijs per dag ¹ Niet beschikbaar
Geregistreerde indicatie BMI > 28 kg/m ² en obesitas gerelateerde aandoeningen	Geregistreerde indicatie Als aanvulling op een caloriearm dieet en meer lichaamsbeweging ten behoeve van gewichtsbeheersing BMI ≥ 27 kg/m ² tot < 30 kg/m ² (overgewicht) met ten minste één gewichtsgelateerde comorbiditeit, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu of hart- en vaatziekte. BMI ≥ 30 kg/m ²
Vergoeding ² Geen vergoeding	Vergoeding ² Geen vergoeding

Voor uitgebreide informatie over werking en bijwerkingen van de medicatie, kunt u het Farmacotherapeutisch Kompas raadplegen.





Behandeloptie 3:

Metabole chirurgie

Indien GLI en maximale inzet gewichtsreducerende medicatie onvoldoende effect hebben overweeg metabole chirurgie



Samen met uw patiënt kunt u de mogelijke behandelopties bespreken en tot een behandelplan komen dat toegespitst is op uw patiënt.

Zodra uw patiënt gestart is met de behandeling, zorg voor regelmatige follow-up.

Veel succes!

*Effectiviteit is niet direct vergeleken, classificering op basis van effectiviteit beschreven in richtlijn. Voor beschouwing van de indicaties, contra-indicaties en bijwerkingenprofiel zie de samenvattingen van productkenmerken.

1. Richtlijn Overgewicht en Obesitas bij volwassenen en kinderen, beschikbaar op www.richtlijndatabase.nl;
2. www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd: 23 november 2023.

Notities:
